


第4回 合成関数の微分

まとめ1 (合成関数)

- 関数 $z = f(x, y)$ は点 (a, b) の近傍 U で定義されているとする.
- 関数 $x(t), y(t)$ はある開区間 I で定義されているとする.
- 点 $(x(t), y(t))$ が

$$(x(t), y(t)) \in I \quad (\forall t \in I)$$

であれば合成関数 $z = f(x(t), y(t))$ ($t \in I$) が定義される.



まとめ2 (合成関数の微分)

上の状況下でさらに $z = f(x, y)$ は点 (a, b) で全微分可能, $x = x(t), y = y(t)$ は $t = c$ で微分可能で $x(c) = a, y(c) = b$ ならば $z = f(x(t), y(t))$ は $t = c$ で微分可能で

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x}(a, b) \frac{dx}{dt}(c) + \frac{\partial z}{\partial y}(a, b) \frac{dy}{dt}(c) \\ [z'(c) &= f_x(a, b)x'(c) + f_y(a, b)y'(c)] \end{aligned}$$

導関数の場合

$z = f(x, y)$ が U の各点で全微分可能, $x = x(t), y = y(t)$ がすべての $t \in I$ で微分可能であるとき, $z = f(x(t), y(t))$ はすべての $t \in I$ で微分可能で

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= f_x(x(t), y(t))x'(t) + f_y(x(t), y(t))y'(t) \end{aligned}$$

まとめ3 (合成関数の(偏)微分法)

- $z = f(x, y)$ は点 (a, b) で全微分可能
- $x = \varphi(u, v), y = \psi(u, v)$ は点 (c, d) で全(偏)微分可能で $a = \varphi(c, d), b = \psi(c, d)$

であるならば $x = f(\varphi(u, v), \psi(u, v))$ は点 (c, d) で全(偏)微分可能で

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x}(a, b) \frac{\partial x}{\partial u}(c, d) + \frac{\partial z}{\partial y}(a, b) \frac{\partial y}{\partial u}(c, d)$$

$$[z_u(c, d) = f_x(a, b)x_u(c, d) + f_y(a, b)y_u(c, d)]$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x}(a, b) \frac{\partial x}{\partial v}(c, d) + \frac{\partial z}{\partial y}(a, b) \frac{\partial y}{\partial v}(c, d)$$

$$[z_v(c, d) = f_x(a, b)x_v(c, d) + f_y(a, b)y_v(c, d)]$$


偏導関数の場合

- $z = f(x, y)$ は U の各点で全微分可能
- $x = \varphi(u, v), y = \psi(u, v)$ は uv 平面の領域 V の各点で全微分可能で, $(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \in U$ ($\forall (u, v) \in V$)

とするとき, $z = f(\varphi(u, v), \psi(u, v))$ は V の各点 (u, v) で全微分可能で

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}$$



演習 1

$z = \log \frac{x}{y}$, $x = e^t + e^{-t}$, $y = e^t - e^{-t}$ のとき $\frac{dz}{dt}$ を求めよ.

解

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

ここで $z = \log x - \log y$ より

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{y}$$

また

$$\frac{dx}{dt} = e^t - e^{-t}, \quad \frac{dy}{dt} = e^t + e^{-t}$$

よって

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{1}{x}(e^t - e^{-t}) - \frac{1}{y}(e^t + e^{-t}) \\&= \frac{1}{e^t + e^{-t}}(e^t - e^{-t}) - \frac{1}{e^t - e^{-t}}(e^t + e^{-t}) \\&= \frac{(e^t - e^{-t})^2 - (e^t + e^{-t})^2}{(e^t + e^{-t})(e^t - e^{-t})} \\&= -\frac{4}{e^{2t} - e^{-2t}} //\end{aligned}$$

演習2 (講義でも扱うかも知れませんが大切な問題なので)

$z = f(x, y), x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ の時 $\frac{\partial z}{\partial r}, \frac{\partial z}{\partial \theta}, \frac{\partial^2 z}{\partial r^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2}$ を求めよ. ただし, $f(x, y)$ は第2次偏導関数まで連続とする.

解 $z = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$

$$\frac{\partial z}{\partial r} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial z}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial z}{\partial y} \sin \theta$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial z}{\partial x} (-r \sin \theta) + \frac{\partial z}{\partial y} (r \cos \theta)$$

ここで $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ はそれぞれ $f_x(r \cos \theta, r \sin \theta), f_y(r \cos \theta, r \sin \theta)$ であり, それぞれ何かある x, y の2変数関数の x, y に $r \cos \theta, r \sin \theta$ が代入されていることに注意.

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \cos \theta + \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \sin \theta && \leftarrow \cos \theta, \sin \theta \text{ は定数扱い} \\ &= \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \frac{\partial y}{\partial r} \right) \cos \theta + \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial r} \right) \sin \theta \\ &= \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cos \theta + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \sin \theta \right) \cos \theta + \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \cos \theta + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \sin \theta \right) \sin \theta && \leftarrow \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \\ &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cos^2 \theta + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \cos \theta \sin \theta + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \sin^2 \theta \end{aligned}$$

次に $\frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2}$ を計算する.

$$\left[\begin{array}{l} \frac{\partial z}{\partial \theta} = \frac{\partial z}{\partial x} (-r \sin \theta) + \frac{\partial z}{\partial y} (r \cos \theta) & \leftarrow \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \text{ にも } \theta \text{ があるので積の微分} \\ f_x(r \cos \theta, r \sin \theta) & f_y(r \cos \theta, r \sin \theta) \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) (-r \sin \theta) + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \theta} (-r \sin \theta) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) (r \cos \theta) + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \theta} (r \cos \theta) \\ &= \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \frac{\partial y}{\partial \theta} \right) (-r \sin \theta) + \frac{\partial z}{\partial x} (-r \cos \theta) \\ &\quad + \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial z}{\partial y} (-r \sin \theta) \\ &= \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} (-r \sin \theta) + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} (r \cos \theta) \right) (-r \sin \theta) + \frac{\partial z}{\partial x} (-r \cos \theta) \\ &\quad + \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} (-r \sin \theta) + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} (r \cos \theta) \right) + \frac{\partial z}{\partial y} (-r \sin \theta) && \leftarrow \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \\ &= r^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \sin^2 \theta - 2r^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \cos \theta \sin \theta + r^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \cos^2 \theta - r \frac{\partial z}{\partial x} \cos \theta - r \frac{\partial z}{\partial y} \sin \theta && // \end{aligned}$$