


第8・9回 2重積分

まとめ1 (長方形上の2重積分の定義)

- D を各辺が座標軸に平行な閉長方形とする :

$$D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\} \\ = [a, b] \times [c, d] \text{ とかく}$$

- D で定義された (有界な) 関数 $f(x, y)$ を考える



($f(x, y) \geq 0$ のとき, 曲面 $z = f(x, y)$ と長方形 D の間の立体を考えている.)

- $[a, b]$ を m 個, $[c, d]$ を n 個の小区間に分割し, その分割を Δ とする :


$$\Delta : \begin{aligned} a &= x_0 < x_1 < \cdots < x_{m-1} < x_m = b \\ c &= y_0 < y_1 < \cdots < y_{n-1} < y_n = d \end{aligned}$$

この分割に対し

$$\begin{aligned} D_{ij} &= \{(x, y) | x_{i-1} \leq x \leq x_i, y_{j-1} \leq y \leq y_j\} \\ &= [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] \quad (i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n) \\ \Delta x_i &= x_i - x_{i-1} \quad (i = 1, \dots, m) \\ \Delta y_j &= y_j - y_{j-1} \quad (j = 1, \dots, n) \\ |\Delta| &= \max\{\Delta x_1, \dots, \Delta x_m, \Delta y_1, \dots, \Delta y_n\} \end{aligned}$$

とおく.

- 各 D_{ij} から代表点 (ξ_{ij}, η_{ij}) ($x_{i-1} \leq \xi_{ij} \leq x_i, y_{j-1} \leq \eta_{ij} \leq y_j$) をとる



- 関数 $f(x, y)$, 分割 Δ , 代表点たち $\{(\xi_{ij}, \eta_{ij})\}$ からリーマン和

$$R = R(f, \Delta, \{(\xi_{ij}, \eta_{ij})\}) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) \Delta x_i \Delta y_j$$

- R が分割 Δ や代表点たち $\{(\xi_{ij}, \eta_{ij})\}$ の取り方によらず $|\Delta| \rightarrow 0$ とするとき, 一定の値に近づくとき $f(x, y)$ は D で積分可能であるといい, この値を

$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

とかき, D における $f(x, y)$ の積分 or 2重積分という.


- $f(x, y)$ が D 上連続であるとき, D で積分可能である.

まとめ2 (一般の領域上の2重積分の定義)

- 一般の有界領域 D の場合は $D \subset D'$ となる (各辺が座標軸と平行な) 長方形をとり

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & (x, y) \in D \\ 0 & (x, y) \notin D \end{cases}$$

とする.



$\tilde{f}(x, y)$ が領域 D' で積分可能であるとき $f(x, y)$ は D で積分可能であるといい

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} \tilde{f}(x, y) dx dy$$

とする. このときこの積分の値は D を含む長方形 D' の取り方によらない. また, $f(x, y)$ の積分可能性は領域 D の影響も受ける.

- $f(x, y) \equiv 1$ としたとき, 上の意味で D 上積分可能であるとき, D は面積確定であるといい.
- D が滑らかな曲線を有限個つないでできる曲線で囲まれた領域などは面積確定である.
- 面積確定な有界閉集合で定義された連続関数は積分可能である.

まとめ3 (2重積分の性質)

D を面積確定集合, $f(x, y)$ は D 上で有界かつ積分可能であるとする.

(1) α, β を定数とすると

$$\iint_D \{\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)\} dx dy = \alpha \iint_D f(x, y) dx dy + \beta \iint_D g(x, y) dx dy$$

(2) $f(x, y) \leq g(x, y)$ on D ならば

$$\iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D g(x, y) dx dy$$

(3) $f(x, y)g(x, y)$ も D 上積分可能である.

教科書の他に

- $m \leq f(x, y) \leq M$ on D (m, M : 定数) ならば

$$m|D| \leq \iint_D f(x, y) dx dy \leq M|D|$$

- $\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \iint_D |f(x, y)| dx dy$
- $D = D_1 \cup D_2$ (D_1, D_2 は面積確定で $D_1 \cap D_2 = \emptyset$) のとき

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

まとめ4 (長方形の場合の計算)

$D = [a, b] \times [c, d]$, $f(x, y)$ を D で連続であるとする. このとき 2重積分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ は次のように計算することができる.

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left\{ \underbrace{\int_c^d f(x, y) dy}_{x \text{ を固定して } y \text{ について積分}} \right\} dx = \int_c^d \left\{ \underbrace{\int_a^b f(x, y) dx}_{y \text{ を固定して } x \text{ について積分}} \right\} dy$$


このように 1変数関数の積分を繰り返して 2重積分を計算する方法を**累次積分**という.

演習1

$D = [1, 2] \times [0, 1] (= \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\})$ のとき 2 重積分

$$\iint_D (x^2 - xy) dx dy$$

の値を求めよ.



解

$$\text{与式} = \int_1^2 \left\{ \underbrace{\int_0^1 (x^2 - xy) dy}_{y \text{ の関数とみての積分} \rightarrow x \text{ は定数扱い}} \right\} dx$$

$$\begin{aligned} &= \int_1^2 \left[x^2 y - \frac{1}{2} x y^2 \right]_{y=0}^{y=1} dx \\ &= \int_1^2 \left(x^2 - \frac{1}{2} x \right) dx = \left[\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^2 \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{8}{3} - \frac{4}{4} \right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{19}{12} \end{aligned}$$

次のように計算してもよい：

$$\text{与式} = \int_0^1 \left\{ \underbrace{\int_1^2 (x^2 - xy) dx}_{x \text{ の関数とみての積分} \rightarrow y \text{ は定数扱い}} \right\} dy$$


$$\begin{aligned} &= \int_0^1 \left[\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} x^2 y \right]_{x=1}^{x=2} dy \\ &= \int_0^1 \left\{ \left(\frac{8}{3} - 2y \right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} y \right) \right\} dy = \int_0^1 \left(\frac{7}{3} - \frac{3}{2} y \right) dy \\ &= \left[\frac{7}{3} y - \frac{3}{4} y^2 \right]_0^1 = \frac{19}{12} \end{aligned}$$

まとめ5 (縦線型領域・横線型領域)

- 閉区間 $[a, b]$ 上で $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$ を満たす連続関数 $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ を用いて D が

$$D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

と表される領域を**縦線型領域**という。




- $f(x, y)$ が上のような領域 D で連続であるとき

$$\iint_D f(x, y) dxdy = \int_a^b \left\{ \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right\} dx$$

- 閉区間 $[c, d]$ 上で $\psi_1(y) \leq \psi_2(y)$ を満たす連続関数 $\psi_1(y), \psi_2(y)$ を用いて D が

$$D = \{(x, y) | c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$$

と表される領域を**横線型領域**という。



- $f(x, y)$ が上のような領域 D で連続であるとき

$$\iint_D f(x, y) dxdy = \int_c^d \left\{ \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right\} dy$$

まとめ6 (積分の順序変更)

D が

$$\begin{aligned} D &= \{(x, y) | a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\} \\ &= \{(x, y) | c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\} \\ &\quad (\text{縦線型かつ横線型}) \end{aligned}$$

と2通りに表されるとする。 $f(x, y)$ が D で連続ならば

$$\iint_D f(x, y) dxdy = \int_a^b \left\{ \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right\} dx = \int_c^d \left\{ \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right\} dy$$

が成り立つ。このように2重積分は2通りの累次積分で表されるが、一方の累次積分を他方の累次積分に直すことを**積分の順序変更**という。

演習2


次の2重積分を累次積分で求めよ.

$$(1) \iint_D xy dxdy D : 曲線 y = \sqrt{x} \text{ と直線 } y = \frac{1}{2}x \text{ で囲まれた領域}$$

$$(2) \iint_D x dxdy D := \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq x \leq \sin y \right\}$$

解 必ず領域 D を図示する.

(1) 領域 D を図示すると




$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq 4, \frac{1}{2}x \leq y \leq \sqrt{x} \right\} \text{ と表されるので}$$

$$\begin{aligned} \iint_D xy dxdy &= \int_0^4 \left\{ \int_{\frac{1}{2}x}^{\sqrt{x}} xy dy \right\} dx \\ &= \int_0^4 \left[\frac{1}{2}xy^2 \right]_{y=\frac{1}{2}x}^{y=\sqrt{x}} dx = \int_0^4 \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^3 \right) dx \\ &= \left[\frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{32}x^4 \right]_0^4 = \frac{64}{6} - \frac{64 \cdot 4}{32} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

注 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 2, y^2 \leq x \leq 2y\}$ とも表されるので

$$\begin{aligned} \iint_D xy dxdy &= \int_0^2 \left\{ \int_{y^2}^{2y} xy dy \right\} dx = \int_0^2 \left[\frac{1}{2}x^2y \right]_{x=y^2}^{x=2y} dx \\ &= \int_0^2 \left(2y^3 - \frac{1}{2}y^5 \right) dy = \left[\frac{1}{2}y^4 - \frac{1}{12}y^6 \right]_0^2 \\ &= \frac{16}{2} - \frac{64}{12} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

(2) 領域 D を図示すると



$$\begin{aligned}
\iint_D xy \, dxdy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left\{ \int_0^{\sin y} x \, dx \right\} dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{2}x^2 \right]_{x=0}^{\sin y} dy \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 y \, dy = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 y \, dy = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2y}{2} dy \\
&= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}y - \frac{1}{4}\sin 2y \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{8}
\end{aligned}$$

演習 3


累次積分 $\int_0^1 \left\{ \int_y^1 e^{-x^2} dx \right\} dy$ の値を求めよ.

指針

- そのまま計算しようとすると e^{-x^2} の積分を行わなければならないが、 $F'(x) = e^{-x^2}$ となる $F(x)$ は初等関数でかけないことが知られている（→ 積分の順序変更を試みる）
- そのためには D をまず図示


$$\overline{\int_0^1} \left\{ \overline{\int_y^1} e^{-x^2} dx \right\} dy$$

y を 1 つとめたとき,
 $(x=y)$ から $(x=1)$ まで積分
 (直線 $x=y$ と直線 $x=1$ で挟
 められた領域)
 y の範囲は 0 から 1 まで



$D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1\} = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$ と表される。

解 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1\} = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$ とする



$$\begin{aligned}
 & \int_0^1 \left\{ \int_y^1 e^{-x^2} dx \right\} dy = \iint_D e^{-x^2} dxdy \\
 &= \int_0^1 \left\{ \underbrace{\int_0^x e^{-x^2} dy}_{x \text{ は定数扱い}} \right\} dx = \int_0^1 \left[ye^{-x^2} \right]_{y=0}^{y=x} dx \\
 &= \int_0^1 xe^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 (-x^2)' e^{-x^2} dx \\
 &= -\frac{1}{2} [e^{-x^2}]_0^1 = -\frac{1}{2} (e^{-1} - 1) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right)
 \end{aligned}$$